Exercice 3 :

Un magasin vend des ordinateurs. On estime que 40% des acheteurs prennent une garantie entretien. On étudie un exemple de 3 appareils vendus.

1°) Définissez une variable aléatoire. L'expérience est-elle une épreuve de Bernoulli ? Une répétition d'une épreuve de Bernoulli ?

2°) Combien d'acheteurs prendront une garantie ?

3°) Quel intervalle de nombres de garanties (à 0,1 près) faut-il prévoir ?

Exercice 3 :

Un magasin vend des ordinateurs. On estime que 40% des acheteurs prennent une garantie entretien. On étudie un exemple de 3 appareils vendus.

1°) Définissez une variable aléatoire.

Soit X la variable aléatoire donnant le nombre d'appareils avec garantie.

2°) 40% avec garanties (G), 60% sans (S).

possibilités pour le 1^{er} appareil

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

possibilités pour le 2^{ème} appareil

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

possibilités pour le 3^{ème} appareil

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

Ce n'est pas une épreuve de Bernoulli car elle est effectuée 3 fois, et X ne prend pas que 0 et 1 comme valeurs, mais 0, 1, 2 et 3 (succès).

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

Ce n'est pas une **épreuve de Bernoulli** car elle est effectuée 3 fois, et X ne prend pas que 0 et 1 comme valeurs, mais 0, 1, 2 et 3 (succès).

C'est une **répétition** d'une **même épreuve de Bernoulli** car elle est répétée dans les **mêmes** conditions.

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

valeurs x_i prises par X	...	etc...	
$p(X = x_i)$	...		⇒ $E(X) = ?$

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

valeurs x_i prises par X	0	1	2	3
$p(X = x_i)$				

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

$0,6 \times 0,6 \times 0,6$

valeurs x_i prises par X	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	0,216			

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

valeurs x_i prises par X	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	0,216	0,432		

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

$3 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,4$

valeurs x_i prises par X	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	0,216	0,432	0,288	

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

valeurs x_i prises par X	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	0,216	0,432	0,288	0,064

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

2°) Combien d'acheteurs prendront une garantie ?

valeurs x_i prises par X	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	0,216	0,432	0,288	0,064

Espérance de la variable aléatoire (moyenne probable)

$$E(X) = \sum p_i x_i$$

$$= 0,216 \times 0 + 0,432 \times 1 + 0,288 \times 2 + 0,064 \times 3$$

$$= 0 + 0,432 + 0,576 + 0,192$$

$$= \mathbf{1,2}$$

En moyenne, **1,2** acheteurs prendront une garantie.

40% avec garanties (G), 60% sans (S).

3°) Quel intervalle de nombres de garanties (à 0,1 près) faut-il prévoir ?

valeurs x_i prises par X	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	0,216	0,432	0,288	0,064

Ecart-type de la variable aléatoire (écart probable)

$\sigma(X) \approx 0,85 \approx$ écart-moyen des valeurs par rapport à la moyenne

$$E(X) = 1,2$$

$$1,2 - 0,85 = 0,35$$

$$1,2 + 0,85 = 2,05$$

En moyenne, il faut prévoir entre **0,3** et **2,0** garanties.